

Yumurtada 0 gün kalıntı süresi



# Vakit kaybetmeden Kırmızı Tavuk Bitinden kurtulun!

**Sebacil® ByeMite:** Kırmızı tavuk bitine karşı yüksek etkilidir.

Hızlı ve güçlü etkili Sebacil® ByeMite ile kümeslerinizdeki kırmızı bit (*Dermanyssus gallinae*) enfestasyonlarına veda edin. Kırmızı tavuk bitleri geceleri kan emer. Strese, canlı ağırlık kaybına, yemden yararlanma ile yumurta üretiminde düşüşe, anemiye ve hatta ölüme sebep olur. Birçok klinik çalışmada\* vurgulandığı gibi yılda iki defa Sebacil® ByeMite uygulaması ile güvenli, etkili ve uzun süre kalıcı kırmızı bit mücadelesi sağlanır.

\*Keita A et al (2006). Efficacy of Phoxim 50 % EC (ByeMite) for treatment of *Dermanyssus gallinae* in laying hens under field conditions. *Revue Med Vet* 2006 157,12,590-594.

**Sebacil®  
ByeMite %50 EC**



**Sebacil ByeMite %50 EC**

**Formülü:** 1 ml emülsiyon çözelti 500 mg foksim ihtiva eder.

**Kullanım ve Dozaj:** Tavuk kümeslerindeki uygulamada, her 1000 hayvan için 2000 ppm foksim içeren bir pulverizasyon solüsyonu hazırlanır (100 ml Sebacil ByeMite, 25 litre su içerisinde iyice karıştırılır). Hazırlanan çözelti parazitlerin saklandığı hayvanları çevreleyen yüzeylerin üzerine direkt olarak püskürtülür. Başarılı bir tedavi için uygulamanın 7 gün sonra tekrarlanması şarttır. Pulverizasyon solüsyonu, kafeslerin üzerine içlerinde tavuklar varken uygulanabilir ancak uygulama esnasında yem, su ve yumurta ortamda bulunmamalıdır.